

	<p style="text-align: center;">SDIS 70 Guide des procédures opérationnelles</p> <p style="text-align: center;">CONDUITE A TENIR EN CAS DE SUSPICION D'INFECTION AU VIRUS GRIPPE CORONAVIRUS</p>	<p>Fiche n° : 0049</p> <p>MAJ du 18 mars 2020</p> <p>Validité : permanente</p>
<input checked="" type="checkbox"/> Tous les personnels		
<p>Références :</p> <ul style="list-style-type: none"> - définition de cas de nouvelle grippe coronavirus 2019-NCOV - plan de pandémie grippale - plan de continuité du service 		

Attention : Cette fiche annule et remplace la fiche n° 44 du 3 mars 2020.

1 – Définition de cas de nouvelle grippe CORONAVIRUS :

La transmission interhumaine du 2019-nCoV est avérée.

Un cas possible de grippe CORONAVIRUS concerne une personne présentant :

- signes généraux : fièvre >38°, courbature, asthénie,
- Et / ou difficultés respiratoires.**

ou désigné par le CRRA 15.

2 – Protection du personnel :

a) Equipement de protection individuelle à disposition :

			VSAV	CPI
Intervenant(s)	Risque infectieux niveau 1 :	- 8 Masques FFP2 - Gants - 8 paires de Lunettes	Dotation par VSAV	- 6 masques FFP2 - Gants - 2 paires de lunettes
	Risque infectieux niveau 2 :	- 8 Combinaisons ou (blouses + charlottes)	Dotation par VSAV	- 2 Combinaisons ou (blouses + charlottes)
	Solution hydroalcoolique		Dotation par VSAV	En dotation
Victime(s)	8 Masques chirurgicaux en priorité		Dotation par VSAV	0 masque (utilisation d'un des 6 masques FFP2)

L'équipement de protection contre les risques infectieux protège le personnel intervenant de tout risque de contamination lorsque celui-ci est correctement porté.

Protection de la victime :

Pour toutes interventions SUAP, équiper la victime d'un masque chirurgical (FFP2 pour les CPI).

Protection des intervenants :

- Pour toutes interventions SUAP classiques, les SP s'équipent avec les équipements du protocole infectieux niveau 1.
- Pour toutes interventions en présence d'une victime suspecte du COVID-19 et ACR, les SP s'équipent avec les équipements du protocole infectieux niveau 2.


b) Consignes d'utilisation des EPI :

Type de matériel	Modalités d'utilisation	Modalités de traitement
Masques chirurgicaux pour les victimes	Usage unique	DASRI
Masques FFP2 Intervenants	Usage unique	DASRI
Gants	Usage unique	DASRI
Lunettes de protection	Usage multiple	Désinfection obligatoire après chaque utilisation : trempage 30 minutes dans solution Surfanios à la dilution habituelle
Combinaison ou (blouse + charlotte)	Usage unique	DASRI
Solution hydroalcoolique	Avant / après chaque intervention pour le SP Dès la prise en charge pour la victime	Conserver le flacon pour le remplissage ultérieur.

3 – Situation pandémique : virus circulant dans l'hexagone :

!

- En cas d'intervention pour toute mission SUAP, application protocole risque infectieux niveau 1
- Dans tous cas suspects ou ACR, application protocole risque infectieux niveau 2



	Cas possible Coronavirus ou avéré
Moyens engagés par le CTA-CODIS	VSAV 1 ^{er} appel et CPI si prompt secours
Effectif de SP engagé	VSAV : 3 SP MAXIMUM, engagement minimum du personnel. Le conducteur ne participe pas à l'intervention si la personne est valide. CPI VL-SUAP ou VL prompt secours : 2 SP MAXIMUM avec équipement risque infectieux niveau 2
Equipement secouriste	Protocole risque infectieux niveau 2 : Masque FFP2 + lunettes + gants et combinaison ou (blouse + charlotte)
Prise en charge du patient	- Le patient se désinfecte les mains - Equiper le patient d'un masque chirurgical ou FFP2 pour les CPI - Contact restreint secouriste-patient
Message radio	- Préciser par radio « mise en œuvre du protocole » à destination du CODIS - Privilégier le canal SSU 223 pour la transmission des bilans
Transport du patient	- Ventiler la cellule et fermer la climatisation - Seul le conducteur dans la cabine du VSAV
Destinations possibles de la victime après régulation médicale	- Pas de transport - Transport au centre hospitalier <u>après régulation CRRA15</u>
Désinfection réalisée en étant équipé des EPI	- Si pas de transport et pour les CPI : désinfection des matériels et des surfaces en contact sur les lieux d'intervention ou au CIS de rattachement. - Si transport au CH : désinfection de la cellule au CH par 1 SP équipés d'EPI – Voir protocole de désinfection fiche n°47.
EPI / intervenants	- Déshabillage, élimination des EPI à usage unique en sac DASRI après désinfection du VSAV, - Nettoyage des mains avec une solution hydroalcoolique, - Désinfection des lunettes au CIS.
Retour d'intervention	Les 3 SP font le retour en centre à l'intérieur de la cabine du VSAV sans EPI.
Compte-rendu	- Ne plus renseigner la fiche « risque infectieux » - Préciser dans votre CRSS l'état de la victime, le type de protocole risque infectieux mis en œuvre, ainsi que le nombre de matériels risque infectieux utilisés par le VSAV et/ou le CPI (Type et nbre d'EPI utilisé). Y compris pour la désinfection. - Valider quotidiennement le CRSS
Renouvellement des EPI	Les CPI sont rééquipés par le VSAV du CD sur intervention. Le CI se réarment au CIP de rattachement. Les CIP seront réapprovisionnés via la plateforme logistique.

Vous êtes tenus de respecter scrupuleusement l'ordre des actions ci-dessus énumérées. Vous devez notamment procéder au retrait des EPI adaptés qu'à l'issue du protocole de désinfection du VSAV et du matériel.

Consignes particulières :

Respecter les circuits d'orientation des victimes mis en place dans les CH (ex Vesoul ou Besançon : circuit COVID-19 ou circuit SUAP classique), ainsi que les consignes données par le personnel soignant.

A l'arrivée au CH, un seul SP (équipé niveau 1 minimum) va informer l'infirmière d'accueil de l'arrivée d'un cas suspect.